

Guía de inicio

a su tratamiento

con **Victoza®**


(SEMAGLUTIDA)

Este material está dirigido a personas a quienes se les prescribió liraglutida. Este material no reemplaza las indicaciones de su médico tratante, es un material de apoyo para ayudarle a entender el medicamento.

Si tiene pregunta o inquietudes, comuníquese con su médico tratante. Para mayor información, consulte el inserto adjunto en la caja del producto.

¡Bienvenido a su *tratamiento!*

En esta guía encontrará
todo lo que debe saber
para comenzar de forma
correcta su terapia con
Liraglutida.



¿Qué es

Victoza[®] (liraglutida)?¹

Victoza[®] (liraglutida) es un medicamento inyectable recetado que, junto con dieta y ejercicio, ayuda a reducir el azúcar en sangre (glucosa) en adultos y niños de 10 años de edad o más con diabetes mellitus tipo 2. **Este medicamento no es apto para uso en personas con diabetes tipo 1.**

¿Cómo *funciona?*¹

Actúa de 3 maneras para reducir el azúcar en sangre:



Estómago: cuando los alimentos salen del estómago demasiado rápido después de comer, los niveles de azúcar en la sangre pueden aumentar fuera de rango. Victoza[®] ayuda a ralentizar este proceso.



Hígado: cuando el hígado produce demasiada azúcar, Victoza[®] ayuda a regular esta producción.



Páncreas: cuando su nivel de azúcar en sangre es demasiado alto, Victoza[®] ayuda al páncreas a producir insulina.

¿Cuál es la **presentación de** liraglutida?¹



La pluma Victoza® contiene 18 mg;
la dosis deberá ser indicada por su
médico tratante



¿Cómo es el sistema de aplicación?¹

La aguja está diseñada para penetrar el tejido debajo de la piel. Cuenta con una punta NovoFine® calibre 32, que tiene solo 6 milímetros de largo. Esto puede ayudarle a evitar la inyección en el músculo. Retire y deseche siempre de forma segura la aguja después de cada inyección y guarde la pluma sin la aguja de inyección colocada. Esto reducirá el potencial de contaminación, infección y fugas y, al mismo tiempo, garantizará la precisión de la dosis.


Los componentes presentes en el empaque de la pluma son¹:



Las agujas necesarias para el uso de su dispositivo no se encuentran incluidas en la caja.


¿Cómo usar la pluma Victoza®?¹

Paso 1




Revise la pluma. Lea la etiqueta para verificar que tiene el medicamento adecuado. El medicamento debe ser transparente e incoloro. No lo use si se ve turbio o coloreado.

Paso 2




Coloque la aguja. Retire la pestaña protectora de la tapa exterior de la aguja y empuje la tapa exterior de la aguja que contiene la aguja directamente sobre la pluma y luego enrosque la aguja hasta que esté segura.

Paso 3



Gire hasta llegar al símbolo de verificación de flujo. Este paso se realiza solo una vez para cada nueva pluma y solo es necesario la primera vez que utiliza una pluma nueva.

Paso 4




Prepare la pluma. Sostenga la pluma con la aguja apuntando hacia arriba y golpee suavemente el cartucho con el dedo unas cuantas veces para llevar las burbujas de aire a la parte superior del cartucho.

Uso de rutina¹

1

Revise la pluma.


Lea la etiqueta para verificar que tiene el medicamento adecuado. El medicamento debe ser transparente e incoloro. No lo use si se ve turbio o coloreado.



2

Coloque la aguja.


Retire la pestaña protectora de la tapa exterior de la aguja y empuje la tapa exterior de la aguja que contiene la aguja directamente sobre la pluma y luego enrosque la aguja hasta que esté segura.



3

Seleccione la dosis.


La pluma de Victoza® puede administrar una dosis de 0,6 mg (dosis inicial), 1,2 mg o 1,8 mg. Asegúrese de conocer la dosis que le recetaron. Gire el selector de dosis hasta que la dosis necesaria se alinee con el puntero (0,6 mg, 1,2 mg o 1,8 mg).



4


Inyecte la dosis.

Inserte la aguja en la piel del estómago (abdomen), muslo o parte superior del brazo. No inyecte Victoza® en una vena o músculo. Mantenga la aguja debajo de la piel hasta que el contador de la dosis vuelva a 0 y cuente despacio hasta 6.



5


Retire y deseche la aguja. Coloque con cuidado la tapa exterior de la aguja. Desenrosque la aguja y retire de forma segura la aguja de su pluma después de cada uso.



Recomendaciones de almacenamiento¹

Antes del primer uso:

Refrigerar entre 2 °C y 8 °C (mantener lejos del congelador y no almacenar en la puerta de la nevera). No congelar.



Después del primer uso:

Deseche la pluma usada 30 días después de comenzar a usarla, incluso si queda algo de medicamento en la pluma.

- 1** Guarde su pluma a una temperatura de 15 °C a 30 °C o en un refrigerador a una temperatura de 2 °C a 8 °C.
- 2** Cuando lleve la pluma fuera de casa, guárdela a una temperatura de entre 15 °C a 30 °C.
- 3** Si Victoza® ha estado expuesto a temperaturas superiores a 30°C, debe desecharse.
- 4** Proteja su pluma del calor y la luz solar.
- 5** Mantenga puesta la tapa de la pluma cuando no esté en uso. Retire siempre la aguja después de cada inyección y guarde la pluma sin la aguja colocada, esto reduce el riesgo de contaminación, infección, fugas y dosificación inexacta.

¿Cuál es *la frecuencia* de uso?¹



Una vez
al día





REFERENCIAS

1. VICTOZA ® información para prescribir.

Registro sanitario de Victoza®: Guatemala PF-46583. Honduras HN-BT-0619-0005. República Dominicana 2015-1074. Costa Rica MB-DK-18-00010. Panamá 93210. Paraguay 22268-02-MB. Perú Victoza® R.S. N°.: BE-00965. Material educativo dirigido a pacientes. Novo Nordisk®, Novo Día® y Victoza® son marcas registradas propiedad de Novo Nordisk A/S. Material revisado y aprobado por la Dirección de Asuntos Médicos y Legales de Novo Nordisk. En caso que desee reportar un evento adverso, escriba al siguiente correo: io-balat-clat-safety@novonordisk.com. Esta información está dirigida a pacientes y no debe sustituir las indicaciones de su médico. CLA24PAT00004